



INICIADOR MEAT PELLETEADO

BOVINOS CARNE



COMPOSICIÓN

CALCIO	10 %
SODIO	3.2 %
MAGNESIO	4.5 %
VITAMINA A	40.000 UI/kg
VITAMINA E	260 ppm
VITAMINA D3	8.000 UI/kg
VITAMINA B1	26 ppm
ZINC	480 ppm
MANGANESO	480 ppm
SELENIO	2.4 ppm
COBALTO	1.6 ppm
YODO	8 ppm
CLORTETRACICLINA	1250 ppm
MONENSINA	400 ppm

En la etapa inicial de los engordes a corral ocurren las pérdidas más importantes del proceso productivo. La sumatoria de factores como el destete, el transporte, los cambios climáticos, el confinamiento, el contacto con animales de otros orígenes, los cambios de dieta, etc. favorecen la presentación de enfermedades clínicas y subclínicas. En la región pampeana esta situación coincide, además, con el inicio de las lluvias más frecuentes y la zafra de terneros. El Síndrome Respiratorio Bovino (SRB) es la primera causa de muertes dentro de los feedlots. En nuestro país la prevención sanitaria que se puede realizar es acotada por el tipo de vacunas que disponemos. Además, los tratamientos demandan de una recorrida muy detallada y la metafilaxia inyectable también tiene sus limitaciones operativas. Por ello, aún en la actualidad se sigue conviviendo con niveles elevados de pérdidas en el inicio de los engordes a corral.

DOSIFICACIÓN

Incluir al 5% en base seca de la ración total o garantizar un consumo de 300-350 gramos/cabeza durante 15 días como mínimo.

PRESENTACIÓN

BOLSA DE 25 KG

